

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 16-5-74 749483

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34076 MONTPELLIER-CEDEX

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

30 Francs

Nouvelle série N° 18

ABRICOTIER

OIDIUM - ANARSIA - COCHENILLES

La lutte contre l'oïdium doit être continuée de façon constante afin d'assurer le maximum de qualité à une récolte très réduite. Ajouter un insecticide approprié à la bouillie fongique dans les vergers où la présence d'anarsia (petite mineuse) a été constatée, ainsi qu'en Roussillon dans la zone infestée par la cochenille virgule, les larves étant en cours de dispersion; contre les cochenilles utiliser le méthidathion (40 g/hl), l'oléoparathion (25 g/hl) les parathions émulsions (30 g/hl). Le traitement anti cochenille sera répété 8 à 10 jours plus tard.

CERISIER

MOUCHE DE LA CERISE

Dans les plantations où l'on peut craindre des attaques de mouche de la cerise, deux pulvérisations (à 10 jours d'intervalle) assureront la protection. Toutes les variétés arrivant à maturité après Jaboulay doivent être protégées. Exceptionnellement nous pensons que Jaboulay et les variétés de même maturité doivent, cette année, recevoir un traitement. Utiliser : au moins 15 jours avant la récolte, le diazinon, l'oléoparathion ou le fenthion; au moins 10 jours le diméthoate; au moins 7 jours avant la récolte le formothion ou le malathion.

PECHER - AMANDIER

TORDEUSE ORIENTALE

Les éclosions sont constatées de façon continue, avec plus ou moins de régularité quant à leur importance quotidienne, dans les élevages du Gard, de l'Hérault et du Roussillon. Les postes de piégeage du Gard, de l'Hérault, du Narbonnais enregistrent des captures parfois très nombreuses. Enfin dans le département du Gard quelques dégâts sur pousses ont été observés en fin de semaine (9 et 10 Mai) dans un verger où des circonstances exceptionnelles étaient réunies. En fait, sauf en pépinières et dans les jeunes plantations dont il faut assurer la bonne formation des arbres, il est inutile de traiter.

FUSICOCUM

Nous rappelons la nécessité de traiter après l'éclaircissage des fruits.

PUCERONS

Surveiller très attentivement les plantations et traiter dès que nécessaire.

POIRIER - POMMIER

TAVELURE et OIDIUM

En raison du développement rapide de la végétation, assurer à nouveau la protection. Sur pommier, ajouter un anti oïdium ou utiliser un produit efficace contre les deux champignons.

L'Inspecteur,

BERVILLE

Les Ingénieurs,

CHRESTIAN - TROUILLON

Tirage du 14 Mai 1974 - 2 150 exemplaires

Montpellier le 14 Mai 1974

NOTE : 4

Tél : 63-05-32

MILDIOU

Les pluies de la journée du 10 Mai qui ont été assez abondantes dans le Gard ont permis l'extension des foyers primaires existant déjà à Agde, Boujan, Bouzigues, Montblanc, le Pouget (Hérault), St Côme et Maruejols, St Laurent d'Aigouze (Gard) etc ...

Qu'il s'agisse de vignes desherbées ou conduites normalement, ces lésions ont jusqu'à maintenant été découvertes sur les repousses non supprimées existant au pied des souches.

De nouvelles taches devraient apparaître à partir du 18 Mai ; il convient de les rechercher et, s'il y a lieu, d'appliquer un nouveau traitement.

EUDEMIS

Le vol de première génération se poursuit à l'Est de Montpellier (Hérault) et à Pont Saint Esprit (Gard). Il a été en retard au Cailar et à Gallician (Gard) ; il commence à Douzens et à Limoux (Aude) où le traitement ne se justifiera que dans quelques jours.

On aura recours au Carbaryl joint à un acaricide, ou à l'un des produits suivants : Acéphate, Azinphos, Fénitrothion, Lannate, Méthidathion, Monocrotophos.

Lorsque la présence des premières chenilles sera effective on emploiera le Dichlorvos ou le Parathion accompagné d'un acaricide.

COCHYLIS

Le vol débute dans le Gard.

G. BERNON

Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles